


Tome el control de sus triglicéridos: Haga un seguimiento de su progreso con TRYNGOLZA



Marque su nivel de triglicéridos en el siguiente gráfico.

Comparta este gráfico con su médico para guiar las conversaciones sobre cómo le está funcionando su tratamiento.



No se alarme si hay pequeños aumentos para un único resultado de prueba. Esto no significa necesariamente que el tratamiento haya dejado de funcionar. Compare la tendencia general de su nivel de triglicéridos antes y después de empezar con TRYNGOLZA y hable con su médico.

Puede haber distintos motivos por los que su nivel de triglicéridos aumenta ligeramente entre las extracciones de sangre, como los siguientes

- Consumir una comida rica en grasas entre 8 y 12 horas antes de una prueba
- Beber alcohol, ya que contiene gran cantidad de azúcar y calorías
- Embarazo

Obtenga más información sobre cómo manejar su nivel de triglicéridos con Ionis Every Step™. Visite TRYNGOLZA.com/Enroll para inscribirse hoy mismo.

INDICACIÓN

TRYNGOLZA (olezarsén) es un medicamento con receta que se utiliza junto con dieta para reducir los triglicéridos (grasa en la sangre) y disminuir el riesgo de inflamación aguda del páncreas (pancreatitis) en el tratamiento de adultos con una afección caracterizada por niveles muy altos de triglicéridos en la sangre llamada hipertrigliceridemia grave (HTGg). Se desconoce si TRYNGOLZA es seguro y eficaz en niños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

No use TRYNGOLZA si ha tenido una reacción alérgica grave a TRYNGOLZA o a cualquiera de los ingredientes de TRYNGOLZA.

Antes de usar TRYNGOLZA, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si usted está embarazada o planea quedar embarazada, y si está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si TRYNGOLZA puede dañar al bebé en gestación o si pasa a la leche materna y si puede dañar al bebé.

Consulte la Información importante de seguridad en todo el documento, así como la Información de prescripción completa y la Información para el paciente adjuntas de TRYNGOLZA, también disponibles en TRYNGOLZA.com.

Ayude a salir de la zona de peligro: Maneje sus triglicéridos con TRYNGOLZA



Los triglicéridos son un tipo de grasa que el cuerpo utiliza para almacenar energía



Los triglicéridos provienen de los alimentos que comemos y también se producen dentro del propio cuerpo



Las calorías que no se utilizan se convierten en triglicéridos



Los triglicéridos viajan por el torrente sanguíneo para proporcionar energía por todo el cuerpo



Los triglicéridos se almacenan en las células de grasa hasta que el cuerpo necesita la energía

Los triglicéridos desempeñan un papel importante en su cuerpo, pero cuando el nivel de triglicéridos en la sangre es demasiado alto, pueden aumentar su riesgo de tener ciertos problemas de salud, como pancreatitis aguda

NORMAL: triglicéridos por debajo de 150 mg/dl

- Este se considera un nivel de triglicéridos saludable

ALTO: triglicéridos entre 150 y 499 mg/dl

- Este rango se considera elevado o alto

MUY ALTO: triglicéridos entre 500 y 879 mg/dl

- Este rango se considera muy alto, y su médico puede referirse a él como hipertrigliceridemia grave

EXTREMADAMENTE ALTO: triglicéridos por encima de 880 mg/dl

- Este nivel se considera extremadamente alto y puede verse influido por factores genéticos



Los niveles altos de triglicéridos pueden deberse a su dieta, consumo de alcohol, baja actividad física o incluso a algunos medicamentos.

Use el registro de triglicéridos, que se encuentra del otro lado, cuando converse con su médico sobre su recorrido de tratamiento



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TRYNGOLZA?

TRYNGOLZA puede causar efectos secundarios, incluidas reacciones alérgicas que pueden ser graves. Las reacciones alérgicas pueden incluir enrojecimiento de la piel, bultos rojos que pican (urticaria), hinchazón de la cara, escalofríos o dificultad para respirar. Deje de tomar TRYNGOLZA y llame a su proveedor de atención médica o busque ayuda de emergencia de inmediato si tiene alguno de estos síntomas.

TRYNGOLZA puede causar aumentos en las enzimas hepáticas y en la grasa almacenada dentro del hígado. Su proveedor de atención médica puede hacerle pruebas hepáticas antes de que comience a usar TRYNGOLZA o si hay un aumento en su dosis. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene los siguientes síntomas de problemas hepáticos: sensación de cansancio o debilidad, molestias en la parte superior derecha del estómago, coloración amarillenta de la piel y los ojos, pérdida del apetito u orina de color oscuro.

Los efectos secundarios más frecuentes de TRYNGOLZA en personas con HTGg incluyen reacciones en el lugar de inyección (como enrojecimiento, picazón, erupción cutánea o dolor en el lugar de inyección) y aumento de las enzimas hepáticas.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de TRYNGOLZA. Informe a su proveedor de atención médica o equipo de tratamiento sobre cualquier efecto secundario que pueda tener.

Se le recomienda que informe los efectos secundarios negativos de los fármacos con receta a la FDA. Visite www.fda.gov/safety/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte la [Información de prescripción completa](#) y la [Información para el paciente](#) de TRYNGOLZA, también disponibles en TRYNGOLZA.com.