

¿TIENE PROBLEMAS CON LOS TRIGLICÉRIDOS MUY ALTOS?

TRYNGOLZA puede ayudarle.

En esta hoja informativa encontrará información importante sobre TRYNGOLZA [*trin-GOLE-zah*], una opción de tratamiento para adultos con triglicéridos muy altos (500 mg/dl o más).



¿Qué son los triglicéridos?

Los triglicéridos son un tipo de grasa en la sangre que actúan como una fuente de energía. Niveles muy altos de triglicéridos pueden causar problemas de salud graves. Los médicos miden sus niveles de triglicéridos, junto con otras grasas en la sangre, como parte de un análisis de sangre denominado panel lipídico. Un nivel de triglicéridos de 500 mg/dl o superior es considerado muy alto. Los niveles de triglicéridos que son consistentemente de 880 mg/dl o más podrían ser un signo de una forma genética rara de triglicéridos muy altos denominada síndrome de quilomicronemia familiar o SQF.



¿Por qué es importante reducir los triglicéridos muy altos?

Los riesgos graves de los triglicéridos muy altos incluyen una inflamación aguda o repentina del páncreas (pancreatitis). La pancreatitis es una afección dolorosa en la que el páncreas se inflama. Puede causar dolor de estómago intenso e insuficiencia orgánica. Puede requerir una hospitalización para recibir tratamiento.



¿Qué es TRYNGOLZA?

TRYNGOLZA es un medicamento con receta que se utiliza junto con dieta para reducir los triglicéridos y disminuir el riesgo de inflamación aguda del páncreas (pancreatitis) en el tratamiento de adultos con una afección caracterizada por niveles muy altos de triglicéridos en la sangre llamada hipertrigliceridemia grave (HTGg).

TRYNGOLZA también es un medicamento con receta que se utiliza junto con dieta para reducir los triglicéridos (grasa en la sangre) en el tratamiento de adultos con una afección que impide que el cuerpo descomponga grasas denominada síndrome de quilomicronemia familiar (SQF).

Se desconoce si TRYNGOLZA es seguro y eficaz en niños.



¿Cómo puede ayudarme TRYNGOLZA?

En 2 ensayos clínicos de adultos con triglicéridos muy altos, TRYNGOLZA redujo significativamente los niveles de triglicéridos a los 6 meses y disminuyó el riesgo de pancreatitis a los 12 meses en comparación con el placebo. En un ensayo clínico de adultos con SQF, TRYNGOLZA redujo significativamente los niveles de triglicéridos a los 6 meses en comparación con el placebo.



¿Qué debo saber sobre TRYNGOLZA?

No use TRYNGOLZA si ha tenido una reacción alérgica grave a TRYNGOLZA o a cualquiera de los ingredientes de TRYNGOLZA.

Antes de usar TRYNGOLZA, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si usted está embarazada o planea quedar embarazada, y si está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si TRYNGOLZA puede dañar al bebé en gestación o si pasa a la leche materna y si puede dañar al bebé.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.



¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TRYNGOLZA?

TRYNGOLZA puede causar efectos secundarios, incluidas reacciones alérgicas que pueden ser graves. Las reacciones alérgicas pueden incluir enrojecimiento de la piel, bultos rojos que pican (urticaria), hinchazón de la cara, escalofríos o dificultad para respirar. Deje de tomar TRYNGOLZA y llame a su proveedor de atención médica o busque ayuda de emergencia de inmediato si tiene alguno de estos síntomas.

TRYNGOLZA puede causar aumentos en las enzimas hepáticas y en la grasa almacenada dentro del hígado. Su proveedor de atención médica puede hacerle pruebas hepáticas antes de que comience a usar TRYNGOLZA o si hay un aumento en su dosis. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene los siguientes síntomas: sensación de cansancio o debilidad, molestias en la parte superior derecha del estómago, coloración amarillenta de la piel y los ojos, pérdida del apetito u orina de color oscuro.

Los efectos secundarios más frecuentes de TRYNGOLZA en personas con SQF incluyen reacciones en el lugar de inyección (como enrojecimiento, picazón, erupción cutánea o dolor en el lugar de inyección), disminución del recuento de plaquetas (células sanguíneas que ayudan a coagular la sangre) y dolor o rigidez articulares.

Los efectos secundarios más frecuentes de TRYNGOLZA en personas con HTGg incluyen reacciones en el lugar de inyección (como enrojecimiento, picazón, erupción cutánea o dolor en el lugar de inyección) y aumento de las enzimas hepáticas.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de TRYNGOLZA. Informe a su proveedor de atención médica o equipo de tratamiento sobre cualquier efecto secundario que pueda tener.

Se le recomienda que informe los efectos secundarios negativos de los fármacos con receta a la FDA. Visite www.fda.gov/safety/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Antes de comenzar con TRYNGOLZA, es importante que hable con su médico sobre los beneficios y riesgos del tratamiento.



¿Cómo obtengo TRYNGOLZA?

Si su médico le receta TRYNGOLZA, puede inscribirse en Ionis Every Step™, un programa que proporciona recursos y apoyo para ayudarle a comenzar con TRYNGOLZA para manejar su tratamiento de forma rápida y con confianza. **Inscríbase en línea** o llame al 1-844-789-8744 de lunes a viernes, de 8:00 A. M. a 8:00 P. M. hora del este, para obtener más información.

¿Quiere obtener más información sobre TRYNGOLZA?

Encuentre más información y otros recursos útiles en TRYNGOLZA.com

Consulte la [Información de prescripción completa](#) y la [Información para el paciente](#) de TRYNGOLZA, también disponible en TRYNGOLZA.com.