

LEER:


Recordatorios importantes sobre cómo inyectar TRYNGOLZA



TRYNGOLZA es para adultos con triglicéridos muy altos, también conocidos como hipertrigliceridemia grave, y adultos con síndrome de quilomicronemia familiar o SQF; que se utiliza junto con dieta. Los siguientes consejos pueden ayudarle a sentirse seguro al administrar su inyección mensual. Estos no son todos los pasos para inyectar TRYNGOLZA. Para obtener información adicional, consulte las Instrucciones de uso completas de TRYNGOLZA y/o hable con su médico.


Tres pasos fáciles para inyectar TRYNGOLZA

Coloque



Retire la tapa transparente tirándola hacia afuera en línea recta. Coloque el protector anaranjado de la aguja en un ángulo de 90 grados contra la piel. **Asegúrese de poder ver la ventana de visualización.**

Empuje



Presione firmemente y sostenga el autoinyector recto contra la piel. Escuchará un clic cuando comienza la inyección. **Puede oír un segundo clic. Es normal. El procedimiento no ha finalizado.**

Sostenga



Continúe **sosteniendo el autoinyector firmemente contra la piel durante 10 segundos** para asegurarse de que se haya administrado la dosis completa. Retire el autoinyector levantándolo en línea recta.



TRYNGOLZA está disponible en dosis de 80 mg y 50 mg.

La etiqueta de su autoinyector puede tener un aspecto diferente, según la dosis que le recete su proveedor de atención médica.



- **No empuje el protector anaranjado de la aguja contra la mano o el dedo**
- **No mueva, gire ni cambie el ángulo del autoinyector durante la inyección**
- **Revise que el vástago naranja del émbolo haya llenado toda la ventana de visualización para asegurarse de que se administró la dosis completa**
- **Coloque el autoinyector usado en un recipiente para objetos cortopunzantes después del uso**

[Haga clic para ver un video de instrucciones](#)



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA E INDICACIONES

No use TRYNGOLZA si ha tenido una reacción alérgica grave a TRYNGOLZA o a cualquiera de los ingredientes de TRYNGOLZA.

Consulte la Información importante de seguridad en todo el documento y la Información de prescripción completa y la Información para el paciente de TRYNGOLZA.



Haga clic para ver un video de instrucciones 

Para obtener más información sobre cómo inyectar TRYNGOLZA, comuníquese con el servicio de apoyo de Ionis Every Step™ en el 1-844-789-8744.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA E INDICACIONES

Antes de usar TRYNGOLZA, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si usted está embarazada o planea quedar embarazada, y si está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si TRYNGOLZA puede dañar al bebé en gestación o si pasa a la leche materna y si puede dañar al bebé.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TRYNGOLZA?

TRYNGOLZA puede causar efectos secundarios, incluidas reacciones alérgicas que pueden ser graves. Las reacciones alérgicas pueden incluir enrojecimiento de la piel, bultos rojos que pican (urticaria), hinchazón de la cara, escalofríos o dificultad para respirar. Deje de tomar TRYNGOLZA y llame a su proveedor de atención médica o busque ayuda de emergencia de inmediato si tiene alguno de estos síntomas.

TRYNGOLZA puede causar aumentos en las enzimas hepáticas y en la grasa almacenada dentro del hígado. Su proveedor de atención médica puede hacerle pruebas hepáticas antes de que comience a usar TRYNGOLZA o si hay un aumento en su dosis. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene los siguientes síntomas: sensación de cansancio o debilidad, molestias en la parte superior derecha del estómago, coloración amarillenta de la piel y los ojos, pérdida del apetito u orina de color oscuro.

Los efectos secundarios más frecuentes de TRYNGOLZA en personas con SQF incluyen reacciones en el lugar de inyección (como enrojecimiento, picazón, erupción cutánea o dolor en el lugar de inyección), disminución del recuento de plaquetas (células sanguíneas que ayudan a coagular la sangre) y dolor o rigidez articulares.

Los efectos secundarios más frecuentes de TRYNGOLZA en personas con HTGg incluyen reacciones en el lugar de inyección (como enrojecimiento, picazón, erupción cutánea o dolor en el lugar de inyección) y aumento de las enzimas hepáticas.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de TRYNGOLZA. Informe a su proveedor de atención médica o equipo de tratamiento sobre cualquier efecto secundario que pueda tener.

Se le recomienda que informe los efectos secundarios negativos de los fármacos con receta a la FDA. Visite www.fda.gov/safety/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

INDICACIONES

TRYNGOLZA (olezarsén) es un medicamento con receta que se utiliza junto con dieta para:

- Reducir los triglicéridos (grasa en la sangre) en el tratamiento de adultos con una afección que impide que el cuerpo descomponga las grasas denominada síndrome de quilomicronemia familiar (SQF).
- Reducir los triglicéridos y disminuir el riesgo de inflamación aguda del páncreas (pancreatitis) en el tratamiento de adultos con una afección caracterizada por niveles muy altos de triglicéridos en la sangre llamada hipertrigliceridemia grave (HTGg).

Se desconoce si TRYNGOLZA es seguro y eficaz en niños.

Consulte la Información importante de seguridad en todo el documento y la Información de prescripción completa y la Información para el paciente de TRYNGOLZA.